جامعة حماه
كلية الطب البيطري
قسم التشريح المرضي

مادة علم الأمراض العام
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١\٢٠٢٢

التنكس
Degeneration

الدكتور واصف سلمان الوسوف

المحاضرة الثالثة

التنكس الدهني Fat Degeneration:

التنكس الدهني : هو اضطراب استقلاب وتبادل الدهون في هيولى الخلايا يظهر على شكل تراكم غير طبيعي للدهن في هيولى الخلايا، وأهم موقع لهذه الآفة هو الكبد والنبيبات الكلوية وخلايا العضلة القلبية ويعد التنكس الدهني عكوساً عند زوال المسبب.

أسباب التنكس الدهنى :

* نقص أكسجة النسج لذلك كثيراً ما يصادف هذا التنكس في حالات أمراض القلب والأوعية والأمراض المزمنة الرئوية وأمراض فقر الدم وغيرها.

* - الأمراض المزمنة التي تستمر لفترات طويلة مثل السل والتسمم الدموي.


* - حالات التسمم بالفوسفور أو الزرنيخ أو الكلورفورم وعند الإنسان التسمم بالكحول.

* - نقص فيتامن A الذي يترافق مع نقص الألبومينات في المواد الغذائية مما يؤدي إلى نقص الأنظيمات الضرورية لتبادل واستقلاب الشحوم بصورة طبيعية في الخلية.

*- يحصل التنكس الدهني في الأبقار التي تعاني من الكيتوزس Ketosis، حيث يوجد قلة في السكر المتاح أو عدم القدرة على الاستفادة منه كمصدر للطاقة فيتجه الكبد للدهون كمصدر طاقة ويصبح مشبعاً بها.

في حالة قلة الأكسجة تصاب الخلايا الكبدية بالتنكس الدهني وخاصة القريبة من الوريد المركزي بسبب قلة الأكسجين في هذه المنطقة. وفي حالة التسمم Toxicity يصاب الخلايا حول المسافات البابية أولاً.


الكبد الدهني



عيانياً الكبد كبير الحجم ذو قوام دهني عند قطعه ويتلون بلون بني مائل للأصفر وكلما زاد لون الكبد اصفراراً زدات شدة التنكس. . الكبد الدهني معرض للتمزق والنزف المميت.


يبدو التنكس الدهني مجهرياً في الكبد على شكل قطرات منفردة كبيرة صافية، أو قطرات عديدة صغيرة ذات مظهر رغوي، وقد تكون القطرات حرة في الهيولى أو مرتبطة مع غشاء الخلية. تصبح النواة طرفية عندما تكون القطرات كبيرة وتأخذ الخلية شكل الخاتم.

من الأمثلة المعروفة حالة تنكس العضلات الدهني Steatosis حيث تكون مساحة واسعة من العضلات باهتة أو مرقطة خاصة العضلات المكتظة في القوائم الخلفية والقطن وأكتاف الأبقار وبدون أعراض مرضية.




صورة مجهرية للتنكس الدهني في الكبد

. نسيج كبدي ملون بالسودان الثالث حيث تتلون القطرات الشحمية بلون برتقالي.
. يرافق التغيرات الدهنية ضمور الخلايا الكبدية وزوال ترتيبها الخاص ضمن الأحبال الكبدية الطبيعية



. العضو عضلة قلب، حيث يشاهد العديد من الفراغات الدائرية المختلفة الأحجام.
. هذه الفراغات الدائرية عبارة عن توضع قطرات الدهن ضمن الألياف العضلية.
– القطرات الدهنية تدفع النوى إلى أطراف الألياف العضلية.




ارتشاح الدهن Fatty infiltration:

توجد الخلايا الدهنية في مخازن الدهن أو ما يسمى النسيج الدهني Adipose tissue، والارتشاح الدهني هو تراكم الخلايا الدهنية في أماكن لا توجد فيه بشكل طبيعي، وعادة في الأنسجة الضامرة.

يحصل الاستبدال الدهني في عضلة القلب وعضلات الجسم لأسباب غير معروفة.






- العضو عضلات هيكلية
- يلاحظ وجود مساحات واسعة من خلايا دهنية وتراكمها بين الألياف العضلية
- تدعى هذه الحالة وُرامٌ شَحْمِيّ
- تحصل هذه الحالة لأسباب غير معروفة.

المشتملات داخل الخلية Intracellular inclusions:

تعد القُطَيرات الهياليّنيّة Hyaline droplets مشتملات خلوية، وهي حبيبات صغيرة (ذات طبيعة بروتينية) حامضية الصبغة في هيولى الخلايا، أحد أمثلتها وجود قطرات هيالينية في ظهارة النبيبات بسبب خلل في الكبيبات وهذا يسمح للبروتين بالمرور إلى النبيبات.

يوجد العديد من المشتملات الخلوية التي تكون أحياناً جلية كالمشتملات التي ينتجها الفيروسات في نواة أو هيولي الخلايا المصابة، وقد تكون المشتملات الفيروسية حامضية اللون أو قاعدية، ومفردة أو متعددة. من أحد المشتملات النووية التي يمكن التحري عنها في ظهارة النبيبات الكلوية في بعض حالات التسمم بالرصاص Lead poisoning وتسمى Bricks.

التنكس الهيالييني في الكلية



. هو شكل من ترسب البروتين في النبيبات الكلوية على شكل حبيبات.

ترسب هذه المواد داخل الخلايا الظهارية يؤدي لضيق لمعة النبيبات.


أنماط خاصة من التغيرات التنكسية خارج خلوية

التَنَكُّسُ الزُجاجِيّ Hyalinization:

يستخدم للتعبير عن تغير في الأنسجة بتشكل مواد بروتينية حامضية ناعمة في الأنسجة الضامة أو الأغشية القاعدية.

أما القوالب الزجاجية Hyaline casts فهي محتويات حامضية الصبغة ناعمة في لمعة النبيبات الكلوية نتيجة تخثر البروتين المتسرب من الكبيبات.

تنكس العضلات الزجاجي Hyaline Degeneration in Muscles:



- يلاحظ تقطع الخيوط العضلية وعدم انتظامها وفقدان الأنوية وتحولها إلى كتل زهرية عديمة الشكل.

- هذه مرحلة متقدمة من أذى العضلات

- توضع المادة الزجاجية بين الألياف العضلية.

التنكس الهيالليني في الشرايين Hyaline Degeneration:



- هو شكل من ترسب مواد بروتينية في جدر الأوعية الدموية للكلية.

- حيث يلاحظ في جدار الأوعية مواد زهرية اللون مما يؤدي إلى سماكة الجدار وضيق لمعة الوعاء.


- النبيبات الكلوية طبيعية (سهم)

شَبِيْهُ الفبرين Fibrinoid:

هي مواد عديمة الشكل حامضية الصبغة باهتة توجد بشكل خاص في جدر الأوعية الدموية المختلفة الأحجام.

يشكل الفبرين المكون الأساسي مع بروتينات المصل وخاصة الغلُوبولينٌات المَناعِيّة Immunoglobulins.

هنالك ترابط كبير بين وجود شبيه الفبرين والآفات المناعية الحادة حيث يشارك المعقد المناعي الضدي والمتممة والذي يؤدي إلى تخريب شديد لجدر الأوعية الدموية وتسرب بروتين المصل.



. قد تصيب بعض الحمات الخلايا البطانية الوعائية مثل فقر الدم المعدي في الخيل والحمى النزلية الخبيثة في الأبقار.

. إصابة هذه الخلايا ينشط المتممة وتحفز الجهاز المناعي فيتشكل أضداد وبالتالي معقد مناعي.

. تتخرب جدر الأوعية الدموية فيتسرب بروتين مصل الدم يشكل حزام يتلون بلون زهري.

. يتراكم حول الوعاء الدموي العديد من الخلايا وحيدات النواة



النِقْرِس Gout:

هو مرض يتراكم فيها حمض البول أو بلَّورات اليُورات Urate crystals في الأنسجة وخاصة في فراغات المفاصل وعلى الأسطح المصلية مثل البلورا أو الصفاق أو النبيبات الكلوية.

توضع هذه المواد يترافق مع تناول غذاء غني بالبروتين ويؤدي إلى تخريش وألم والتهاب مزمن.

النَشَوانِي Amyloid:

هي مواد بروتينية سكرية Glycoprotein زهرية اللون عديمة الشكل تتراكم في الأنسجة وخاصة على الأغشية القاعدية، وتحدث آفات ذات أهمية أكلينيكية.

يدعى المرض الدَّاءُالنَّشَوانِيّ Amyloidosis عندما يسبب تغيرات وظيفية وشكلية في العضو المصاب. ويلاحظ النشوان في الأمراض الخمجية المزمنة التي يكون فيها الجهاز المناعي نشطاً لفترة طويلة في تكوين الغلوبيولين المناعي.


من أحد مشاكلات تواجد النشوان أنه يأخذ حيزاً في النسيج ويعيق عمل الأوعية الدموية في العديد من الأنسجة.

ففي الكبيبات الكلوية يؤدي داء النشوان في كبيبات الكلى إلى تسرب شديد لبروتين الدم إلى درجة انخفاض معدل ترشيح الكلية وحدوث يُوريمية Uremia.

في الكبد تسمك جدر الجيبانات مما يضغط على الخلايا الكبدية ويعيق مرور المواد من وإلى الخلايا الكبدية.

يتراكم النشوان في الطحال حول الجريبات اللمفاوية وجدر الشرينات الطحالية Splenic arterioles، وفي أو حول الأوعية الدموية للعديد من الأنسجة.

الدَّاءُ النَّشَوانِيّ في الكلية Amyloidosis Degeneration in Kidney




- صورة مجهرية لنسيج الكلية:

. تبدي الصبغة الخاصة كونغو الحمراء Congo red

. يشاهد تراكم مادة النشوان على الأغشية القاعدية للكبيبات الكلوية بلون برتقالي.


. وجود داء النشوان يعيق عملية ترشيح الكبيبات مما يسمح لبرويتن الدم التسرب خارج الكلية مع البول.

الدَّاءُ النَّشَوانِيّ في الكبد Amyloidosis Degeneration in Liver :




النَشَوانِي Amyloid:

- اللون الزهري الداكن هي خلايا كبدية ضامرة بسبب المساحات الواسعة من النشواني(لون زهري باهت) المتوضع في أشباه الجيوب الكبدية.



Hepatic amyloidosis

داء النشوان في الطحال:



- ✓ يزداد حجم العضو مع حواف مستديرة، ويكون هَشّ.
- ✓ يسمى الطحال المصاب بطحال ساغو (الساغُو ***Sago***) ***spleen*** بسبب ترسب مادة رمادية شمعية شبيهة بالساغُو (نَشا النَّخيل).
- ✓ مجهرياً يتلون النشوان باللون الزهري بـ H & E.

التَكَلُّس Calcification:

يشير هذا التعبير إلى ترسب أملاح الكالسيوم في الأنسجة الرخوة، وإن كان بكميات كافية فيشاهد بالعين المجردة بلون أبيض، بينما تتلون مجهرياً بلون أزرق عند صباغتها بالهيماتوكسيلين والأيوزين، مع ملاحظة أنها قد تختلط على الفاحص مع المستعمرات الجرثومية.

يوجد نوعان من التكلس

- التكلس الحَثَلِيّ Dystrophic calcification ويحصل عندما يدخل الكالسيوم الأنسجة المنتخرة أو المتنكسة كما في مرض ابيضاض العضلات وسل الأبقار.
- التَكَلُّسُ النَقيلِيّ Metastatic calcification حيث تترسب أملاح الكالسيوم على الأغشية القاعدية والألياف المرنة للعديد من الأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية بسبب ارتفاع نسبة كالسيوم الدم أو زيادة فيتامين د .....


التَكَلُّس Calcification:



- يشاهد على صمامات الأبهر وجود ترسبات بلون أبيض مصفر تتكون من أملاح الكالسيوم.
- هذه التوضعات نتيجة التهاب الشغاف وترسب الأملاح.
- يوجد إعاقة في حركة الصمامات مما تسبب قصور قلب.

التَكَلُّس Calcification

ترسب الكلس في جدار الشريان مما يؤدي لتصلبه وسماكة جداره، تبدو التوضعات الكلسية بلون بنفسجي عاتم.



نتائج الأذى غير المميت للخلية والتغيرات الخلوية الثانوية:


- **البلعمة الذاتية Autophagocytosis:**

وهي العملية التي تقوم بها الخلايا المتعرضة للأذى غير المميت بإزالة العضيات المتخربة أو غير الفعالة الناجمة عن الأذى.

تحوي الخلايا المتعرضة للأذى غير المميت على كميات مختلفة من العضيات المتخربة، يقوم الغشاء الهيولي باحاطتها وتغليفها فيتشكل يبلوع ذاتي Autophagosomes الذي يلتحم بدوره مع اليحلول Lysosome وهنا يحدث الهضم بشكل مشابه لعملية البلعمة التي تقوم بها الكريات البيض.


تظهر فجوات البلعمة الذاتية على شكل مشتملات حامضية، وتطرح بعض الفجوات عن طريق الالتقاظ الخلوي Exocytosis وبعضها يبقى كأجسام ثمالية في هيولى الخلية قد تتحول إلى حبيبات ليبوفوكسين.

ألية البلعمة الذاتية



Adaptations That Change Cell Size, Number, or Appearance

التكيفات (التلائمات) التي تغير حجم وعدد أو شكل الخلايا



- الضمور Atrophy
- الضخامة Hypertrophy
- فرط التنسج Hyperplasia
- الحؤول Metaplasia
- خلل التنسج Dysplasia
- نقص التنسج Hypoplasia

الضَخامَة Hypertrophy:


في هذه الحالة لا يزداد عدد خلايا النسيج أو العضو ولكن تكون الخلايا مزيداً من العضيات ويزداد حجم الخلايا والعضو المكونة له مع بقاء التركيب النسيجي للعضو طبيعياً ويميل للحدوث في الخلايا الثابتة أو الدائمة وشائع الحدوث في العضلات المخططة.

تحدث الضخامة التعويضية عند فقدان جزء من عضو أو أحد الأعضاء المزدوجة مثل الكلى فيزداد طول النيفرونات ولا يزداد عددها. قد تزداد سماكة أحد جدران القلب كرد فعل لزيادة متطلبات التهوية أو الجهد العضلي وتحدث الضخامة العضلية بسبب التمارين الرياضية


يمكن أن تحدث الضخامة بسبب زيادة الطلب الوظيفي ؛ إنّ التناول المديد لبعض الأدوية مثل الفينوباربيتال Phenobarbitalوتناول الكحول لفترة طويلة يقود إلى تضخم الشبكة الهيولية االملساء للخلايا الكبدية على اعتبار أنّ هذه المواد تتفكك فيها. بينما يعتر تضخم جهاز غولجي وتضخم الشبكة الهيولية الخشنة مؤشر على ازدياد الحاجة لتكوين البروتين.

تكون الضخامة عادةً رد فعل دفاعي محدد وعكوس ونادراً ما يسبب أذىً للأنسجة المجاورة، ومع هذا لا تكون الضخامة مفيدة دائما فمثلاً تضخم الليفات العضلية في خلايا العضلة القلبية الغير مترافق مع زيادة الأكسجة نتيجة زيادة الكتلة العضلية.

Hypertrophy (increased size of cells)



A



Ductal epithelial hypertrophy

فَرْطُ التَّنَسُّج Hyperplasia:

وهو الزيادة في عدد خلايا نسيج أو عضو باستخدام الانقسام الخيطي مما يؤدي إلى زيادة في النسيج أو جزء من عضو أو كله فيبدو عيانياً متضخماً.

تبدو الخلايا مجهريا مشابهة للخلايا الطبيعية مع زيادة في العدد وقد تزداد في الحجم.

تختلف الخلايا البالغة في خضوعها لعملية فرط التنسج فالخلايا التي تتكاثر في الظروف الطبيعية مثل خلايا الظهارة المعوية والجلد ونقي العظم تصبح بسرعة في حالة فرط التنسج؛ أما الخلايا الدائمة كالخلايا العصبية وخلايا العضلة القلبية وخلايا العضلات الهيكلية لها مقدرة محدودة على التجدد لتقوم بعملية فرط التنسج.

ويحدث فرط التسج فزيولوجياً تحت التأثير الهرموني أو بشكل تعويضي: وكمثال لحالة التأثير الهرموني يلاحظ في حالة تكاثر الظهارة الفارزة في غدة الثدي قبل افراز الحليب وتضخم رحم الحامل.


وكمثال لحالة فرط التنسج التعويضي عند فقد جزء من الجلد.


ويحدث فرط التنسج المرضي بوجود المحرضات المزمنة أو التنبيه الهرموني المفرط ويمكن أن تكون عكوسة في حالة زوال المسبب. وأهمية فرط التنسج تعتمد على المسبب عادتاً.

وتعتبر الخلايا العظمية والغضروفية والعضلات الملساء ذات قدرة متوسطة لتقوم بعملية فرط التنسج.

إن فرط التنسج ليس جزءاً من عملية تكون الأورام؛ رغم أنه قد يزداد عدد الخلايا في موقع ما من النسيج مشكلاًعقيدة تسمى فرط التنسج العقيدي ويجيب تفريق هذه الحالة عن الأورام.


Normal epithelium (low columnar type - mammary gland)






Normal glandular epithelium

Hyperplasia (increased number of cells)





Mammary ductal hyperplasia

نَقْصُ التَّنَسُّج Hypoplasia:

وهو شذوذ يطلق على النمو غير الكامل للعضو أو النسيج يمتد من حالة لا تكون إلى التطور القريب من الطبيعي، وبالتالي لا يصل العضو إلى حجمه الطبيعي .

لم يعرف بالتحديد سبب هذه الحالة فقد تكون متعلقة بالتطور الجنيني أو ببعض الفيروسات التي تصيب خلايا الأجنة المنقسمة بسرعة خلال التطور الجنيني؛ مثل نقص تنسج المخيخ في الأبقار المصابة بالإسهال البقري الحموي BVD أو القطط المصابة قِلَّةُ الكُرَيَّات البيضِ الشَّامِلَة.

الضُمور (نقص حجم العضو أو الخلية) Atrophy :

وهو نقصان حجم نسيج أو عضو ما بعد اكتمال نموه الطبيعي بسبب نقص عدد أو حجم الخلايا المكونة أو كلاهما، وهو تغير تقهقري يحدث عادتاً بسبب أذى متدرج ومستمر. ويحدث لعدة أسباب:

- نتيجة عوز العصب أو المدد الغذائي لمنطقة ما.
- نقصان الجهد العضلي كما هو الحال عند المقعدين.
- أو نخر الخلايا
- هنالك أيضاً ضمور ضغطي بسبب إما وجود أورام أو خراجات تضغط على الأنسجة المجاورة.
- يؤدي تثبيت الأطراف بالجبس أيضاً إلى ضمور الألياف العضلية بشكل متوازي. وإن لم يصل للغدد الصماء تغذية راجعة فإنها قابلة للضمور.
- تحدث بعض الأمراض ضمور شديد في التيموسية مثل ديستمبر الكلاب.


خَلَل التَّنَسُّج Dysplasia:

وهو الشذوذ في تشكل نسيج ما. ومن الأمثلة على ذلك خلل تنسج الكلية وخلل تنسج مفضل الورك. وفي حالة اصابة الظهارات بخلل التنسج يلاحظ زيادة في عدد الخلايا **ضعيفة التمايز أو** الغير ناضجة والتي يمكن أن تكون طلائع لتشكل الأورام. وتكون التغيرات النسيجية قابلة للعكس عند إزالة العامل المسبب.


مجهريا تفقد الخلايا الظهارية المصابة بخلل التنسج ملامحها المميزة حيث تختلف في العدد والحجم (فقدان التجانس) والشكل وزيادة حجم النواة نتيجة فرط الكروماتين وتزداد الأشكال الانقسامية.

يحدث خلل التنسج بسبب التحريض أو الالتهاب المزمن أو الاضطرابات الغذائية.

Dysplasia (abnormal pattern of tissue growth, disorderly arrangement of cells within epithelium)



B



Dysplasia (atypical ductal hyperplasia)

الحُؤول Metaplasia:

وهو تحول النسيج المتمايز كلياً إلى نمط نسيجي أخر متمايز تابع له (نفس النمط الوراثي)، مثل تحول الخلايا الظهارية العامودية الطبيعية إلى خلايا حرشفية ظهارية، ويسمى حؤول حرشفي Squamous metaplasia. وأسباب الحؤول كثيرة منها:

- التهيج المزمن للظهارات، رغم أنّ الحؤول الحرشفي يشكل حاجزاً دفاعياً بين العوامل المهيجة والأنسجة المبطنة في الرغامى والقصبات إلا أنّ فقدان الخلايا الكأسية والأهداب في الخلايا العمودية يضعف الوظيفة الدفاعية للرئتين ضد العوامل الممرضة .
- يكون الحؤول الحرشفي رد فعل ترميمي في الالتهابات المزمنة ؛ كحالة التهاب الضرع المزمن حيث يلاحظ في ظهارة قنوات غدة الضرع.
- عوز فيتامين آ في الممرات البولية أو ظهارة قنوات الغدد اللعابية.
- الخلل الهرموني للأستروجين يحدث حؤولاً حرشفيا في غدة البروستات.

الحؤول قابل للعكس في حالة زاول المسبب، وعلى العكس قد تصبح طليعة ورمية أحياناً.

من أمثلة الحؤول تحول الغضاريف إلى عظم، وفي الطحال قد يتحول جزءً كبير منه إلى نقي عظم عند الحاجة وتسمى حؤولاً نقوياً.